

**Примерные тестовые задания для подготовки к зачетному занятию по
ВДВ "Перинатология"**

1. Прегравидарная подготовка у женщин без нарушения репродуктивной функции включает в себя назначение фолиевой кислоты:

(выберите один вариант ответа)

- A. 400 мкг/сут за месяц до зачатия
- B. 400 мкг/сут за 6 месяцев до зачатия
- C. 200 мкг/сут за месяц до зачатия
- D. 200 мкг/сут за 6 месяцев до зачатия
- E. 600 мкг/сут за месяц до зачатия

2. Консультация эндокринолога в плане прегравидарной патологии показана женщинам с:

(выберите один вариант ответа)

- A. Гипотиреозом
- B. Ожирением
- C. Сахарным диабетом
- D. Все вышеперечисленное
- E. Не показана

3. Что входит в скрининговое обследование в I триместре беременности для выявления ВПР:

(выберите один вариант ответа)

- A. УЗИ
- B. определение ХГ
- C. определение PAPPА
- D. все вышеперечисленное
- E. ничего из перечисленного

4. Какой инвазивный метод диагностики ВПР используют в I триместре беременности:

(выберите один вариант ответа)

- A. Биопсия хориона
- B. Кордоцентез
- C. Амниоскопия
- D. Амниоцентез
- E. УЗИ

5. Какое гормональное обследование проводится во II триместре беременности и для диагностики ВПР:

(выберите один вариант ответа)

- A. альфа-фетопротеин
- B. прогестерон

- C. пролактин
- D. кортизол
- E. тестостерон

6. Какой метод наиболее достоверен для диагностики ВПР во II триместре:

(выберите один вариант ответа)

- A. УЗИ
- B. доплерометрия
- C. КТГ
- D. НГГ
- E. амниоскопия

7. Оптимальный метод для родоразрешения при ВПР:

(выберите один вариант ответа)

- A. кесарево сечение абдоминальное
- B. роды через естественные родовые пути
- C. плодоразрушающие операции
- D. все перечисленное
- E. кесарево сечение влагалищным путем

8. Тактика врача при выявлении грубых аномалий ВПР в I триместре

(выберите один вариант ответа)

- A. пролонгирование беременности до сроков родов
- B. пролонгирование беременности и прерывание ее в поздние сроки
- C. медицинский аборт
- D. прерывание беременности индукцией простагландинов
- E. прерывание беременности индукцией окситоцина

9. Тактика врача при выявлении ВПР не совместимых с жизнью во II триместре:

(выберите один вариант ответа)

- A. Прерывание беременности одним из регламентируемым методом, в зависимости от акушерской ситуации.
- B. Пролонгирование беременности и родоразрешение путем операции кесарева сечения в III триместре.
- C. Пролонгирование беременности до самопроизвольных родов
- D. Проведение медицинского аборта
- E. Только малое кесарево сечение

10. Косвенные симптомы, свидетельствующие о ВПР:

(выберите один вариант ответа)

- A. признаки СЗРП
- B. маловодие
- C. многоводие

- D. нарушение МПК
- E. все вышеперечисленное